

薬品名の印 ㊦ filter ㊨ hydration ㊰ premedication ㊱ route flush ㊳ supportive therapy ㊴ Time control ㊵ washout ㊶ vesicant drug.

* 肝腎機能の項は、指標があるものは「必要」or「不要」、明瞭でないものは「考慮」or「不明」で表記。

《腎細胞がんの抗がん剤療法》

無断転写禁

1 オブジーボ+ヤーボイ 1サイクル=21日間 予定4コース、その後オブジーボ単剤2週毎

		催吐性リスク	最小度							
順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2-21			
1	生理食塩液100mL				div	●				
2	㊴㊦オブジーボ 生理食塩液100mL	240 mg/body	軽度 不要	不要	div(30≤)	●	×			
3	生理食塩液100mL				div(15)	●				
4	㊴㊦ヤーボイ 生理食塩液100mL	1 mg/kg	軽度 不要	不要	div(30≤)	●	×			
5	生理食塩液100mL				div	●				

2 キイトルーダ+インライタ 1サイクル=21日間

		催吐性リスク	最小度							
順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2-21			
1	生理食塩液100mL				div	●				
2	㊴㊦キイトルーダ 生理食塩液100mL	200 mg/body	軽度 不要	不要	div(30≤)	●	×			
3	生理食塩液100mL				div	●				
	インライタ	5mg/回 × 2	中等 減量	CLcr ≥15 不要	内服		連日			

3 オブジーボ単剤療法 1サイクル=14日間

		催吐性リスク	最小度							
順	薬品名(略名)	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2-14			
1	生理食塩液100mL				div	●				
2	㊴㊦オブジーボ 生理食塩液100mL	240 mg/body	軽度 不要	不要	div(30≤)	●	×			
3	生理食塩液100mL				div	●				