

薬品名の印 ㊦ filter ㊨ hydration ㊰ premedication ㊲ route flush ㊳ supportive therapy ㊴ Time control ㊵ washout ㊶ vesicant drug .  
 \* 肝腎機能の項は、指標があるものは「必要」or「不要」、明瞭でないものは「考慮」or「不明」で表記

《胆道癌(胆嚢/胆管)の抗がん剤療法》

無断転載禁止

1 GC療法 1サイクル=21日間

催吐性リスク 中等度(上)

順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2	3	8	9	10	11~21
	アプレピタントカプセル 生食 100 mL	制吐 初日125mg、2・3日80mg			内服 プライミング用	●	●	●	●	●	●	
1	グラニセトロンパッグ 3 mg デキササート 4.95 mg	制吐			点滴30分	●			●			
2	㊰ゲムシタピン 5%ブドウ糖液 100 ml	1000 mg/m <sup>2</sup>	必要	考慮	点滴30分	●	×	×	●	×	×	×
3	ソリューゲンF 500 ml 硫酸Mg補正液 10 mL	水分 負荷			点滴60分	●			●			
4	シスプラチン 生食 500 ml	25 mg/m <sup>2</sup>	軽中 不要	必要	点滴60分	●	×	×	●	×	×	×
5	ソリューゲンF 500 ml	水分 負荷			点滴60分	●			●			

2 GEM単剤 1サイクル=28日間

催吐性リスク 軽度

順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	8	15	16~28
1	グラニセトロンパッグ 3 mg	制吐			点滴30分	●	●	●	
2	㊰ゲムシタピン 5%ブドウ糖液 100 ml	1000 mg/m <sup>2</sup>	必要	考慮	点滴30分	●	●	●	×
3	生食 100 mL				最後の流し	●	●	●	

3 GEM+S1 1サイクル=28日間

催吐性リスク 中等度

順	薬品名	投与量(日)	肝	腎	経路(分)	1	2-7	8	9-14	15~28
	エスワン	BSA(m <sup>2</sup> ) <1.25 (40-20mg) 1.25 ≤ <1.5 (40mg × 2) 1.5 ≤ (50mg × 2)	不明	必要	内服 1日2回	14日間				
1	グラニセトロンパッグ 3 mg	制吐			点滴30分	●		●		
2	㊰ゲムシタピン 5%ブドウ糖液 100 ml	1000 mg/m <sup>2</sup>	必要	考慮	点滴30分	●	×	●	×	×
3	生食 100 mL				最後の流し	●		●		