

薬品名の印 ㊦ filter ㊨ hydration ㊰ premedication ㊱ route flush ㊳ supportive therapy ㊴ Time control ㊵ washout ㊶ vesicant drug.
 * 肝腎機能の項は、指標があるものは「必要」or「不要」、明瞭でないものは「考慮」or「不明」で表記。

《前立腺癌の抗がん剤療法》

無断転載禁止

1 ドセタキセル±プレドニン療法 1サイクル=21日間

催吐性リスク		軽度							
順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2-21		
1	デキサート 6.6 mg 生食 100 mL	制吐			点滴30分	●			
2	㊶ドセタキセル 生食 250 mL	壊死性	75 mg/m ²	必要	不要	点滴60分	●	×	
3	生食 100 mL				点滴	●			
	±プレドニン	10mg/日			内服	連日			

2 ジェブタナ+プレドニン療法 1サイクル=21日間

催吐性リスク		軽度							
順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2	3-21	
1	ボラミン 5 mg ファモチジン 20 mg デキサート 6.6 mg 生食 100 mL	制吐 /抗ア レル ギー			点滴30分	●			
2	生食 100 mL				点滴30分	●			
3	㊦㊰㊶ジェブタナ 生食 250 mL	壊死性	25 mg/m ²	禁忌	注意	点滴60分	●	×	×
4	生食 100 mL				点滴	●			
	プレドニン	10mg/日			内服	連日			
	ジーラスタ	FN予防					●		