

## 《胆道癌(胆嚢/胆管)の抗がん剤療法》

1 **GC±イミフィンジ併用療法** 1サイクル=21日間 イミフィンジ併用レジメンは、GC8コース。以降は、イミフィンジのみをスケジュール4週毎に変更した維持療法に移行。

催吐性リスク		中等度(上)											
順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2	3	8	9	10	11-21	
	アプレピタントカプセル	制吐	初日125mg、2・3日80mg		内服	●	●	●	●	●	●		
	生食 100 mL				プライミング用	●			●				
1	グラニセトロンパック 3 mg デキサート 4.95 mg	制吐			点滴30分	●			●				
2	①⑥イミフィンジ 生食 100 ml		1500 mg/body (20mg/kg*)	軽度 不要	軽中 不要	div(60≤)	●	×	×	×	×	×	
3	⑦ゲムシタピン 5%ブドウ糖液 100 ml		1000 mg/m <sup>2</sup>	必要	考慮	点滴30分	●	×	×	●	×	×	
4	ソリュージェンF 500 ml 硫酸Mg補正液 10 mL	水分 負荷			点滴60分	●			●				
5	ランダ 生食 500 ml		25 mg/m <sup>2</sup>	軽中 不要	必要	点滴60分	●	×	×	●	×	×	
6	ソリュージェンF 500 ml	水分 負荷			点滴60分	●			●				

2 **イミフィンジ維持療法** 1サイクル=28日間 イミフィンジ併用レジメンは、GC8コース。以降は、イミフィンジのみをスケジュール4週毎に変更した維持療法に移行。

催吐性リスク		最小度					
順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2-28
	生食 100 mL				プライミング用	●	
1	①⑥イミフィンジ 生食 100 ml		1500 mg/body (20mg/kg*)	軽度 不要	軽中 不要	div(60≤)	●
2	生食 100 ml				最後の流し	●	×

3 **GEM単剤** 1サイクル=28日間

催吐性リスク		軽度*							
順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	8	15	16-28
1	グラニセトロンパック 3 mg	制吐			点滴30分	●	●	●	
2	⑦ゲムシタピン 5%ブドウ糖液 100 ml		1000 mg/m <sup>2</sup>	必要	考慮	点滴30分	●	●	×
3	生食 100 mL				最後の流し	●	●	●	

4 **GEM+S1** 1サイクル=28日間

催吐性リスク		中等度*								
順	薬品名	投与量(日)	肝	腎	経路(分)	1	2-7	8	9-14	15-28
	エスワン	BSA(m <sup>2</sup> ) <1.25 (40-20mg) 1.25≤<1.5 (40mg×2) 1.5≤ (50mg×2)	不明	必要	内服 1日2回	14日間				
1	グラニセトロンパック 3 mg	制吐			点滴30分	●		●		
2	⑦ゲムシタピン 5%ブドウ糖液 100 ml		1000 mg/m <sup>2</sup>	必要	考慮	点滴30分	●	×	●	×
3	生食 100 mL				最後の流し	●		●		

5 **GCS療法** 1サイクル=14日間

催吐性リスク		中等度(上)								
順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2	3	4-8	9-14
	エスワン	40mg/m <sup>2</sup> ×2/日	不明	必要	内服	7日間(day1夕-day8朝)				×
	アプレピタントカプセル	制吐	初日125mg、2・3日80mg		内服	●	●	●		
	生食 100 mL				プライミング用	●				
1	グラニセトロンパック 3 mg デキサート 4.95 mg	制吐			点滴30分	●				
2	⑦ゲムシタピン 5%ブドウ糖液 100 ml		1000 mg/m <sup>2</sup>	必要	考慮	点滴30分	●	×	×	×
3	ソリュージェンF 500 ml 硫酸Mg補正液 10 mL	水分 負荷			点滴60分	●				
4	ランダ 生食 500 ml		25 mg/m <sup>2</sup>	軽中 不要	必要	点滴60分	●	×	×	×
5	ソリュージェンF 500 ml	水分 負荷			点滴60分	●				