

## 《悪性胸膜中皮腫の抗がん剤療法》

### 1 2週毎オプジーボ+ヤーボイ 01MP680E

催吐性リスク **最小度** 1サイクル=42日間 最大24か月

順	薬品名	投与量	肝	腎	経路・時間	1	2-14	15	16-28	29	30-42
1	生理食塩液100mL	プライミング用				●		●		●	
2	①⑦オプジーボ 生理食塩液100mL	240 mg/body	軽度 不要	不要	点滴30分≤	●	×	●	×	●	×
3	生理食塩液100mL	ルート洗浄			点滴15分	●					
4	④⑥⑧ヤーボイ 生理食塩液20mL	1 mg/kg	軽度 不要	不要	点滴30分≤	●	×	×	×	×	×
5	生理食塩液100mL	ルート洗浄			点滴	●		●		●	

### 2 3週毎オプジーボ+ヤーボイ 01MP071E

催吐性リスク **最小度** 1サイクル=42日間 最大24か月

順	薬品名	投与量	肝	腎	経路・時間	1	2-21	22	23-42
1	生理食塩液100mL	プライミング用				●		●	
2	①⑦オプジーボ 生理食塩液100mL	360 mg/body	軽度 不要	不要	点滴30分≤	●	×	●	×
3	生理食塩液100mL	ルート洗浄			点滴15分	●			
4	④⑥⑧ヤーボイ 生理食塩液20mL	1 mg/kg	軽度 不要	不要	点滴30分≤	●	×	×	×
5	生理食塩液100mL	ルート洗浄			点滴	●		●	

### 3 CDDP+PEM 01MP030E

1サイクル=21-28日間 予定:4-6サイクル.

催吐性リスク **高度**

順	薬品名	投与量	肝	腎	経路・時間	1	2	3	4	5-21
	アプレピタントカプセル	制吐			内服	●	●	●		
	デカドロン 8 mg	制吐			内服		●	●	●	
	生食 100 ml	プライミング			点滴30分	●				
1	生食 250 ml	水分負荷			点滴30分	●				
2	パロノセトロン0.75mg50ml デキサート 9.9 mg	制吐			点滴30分	●				
3	⑤アリムタ 生食 100 ml	500 mg/m <sup>2</sup>	不要	CLor 45≤	点滴10分	●	×	×	×	×
4	ソリューゲンF 500 ml	水分負荷			点滴60分	●				
5	マンニトール 200 ml	利尿			点滴30分	●				
6	⑧ランダ 生食 500 ml	75 mg/m <sup>2</sup>	軽中 不要	必要	点滴120分	●	×	×	×	×
7	ソリューゲンF 500 ml				点滴90分	●				
8	ソリューゲンF 500 ml	水分負荷			点滴90分	●				
	ソリューゲンF 500 ml				点滴120分		●	●		
	ソリューゲンF 500 ml				点滴120分		●	●		

パンピタン末:1g/日:7日以上前から連日経口投与する.最終投与日から22日目まで.

メチコパール注:2A(1mg)/回:少なくとも7日前に筋肉内投与し、9週ごとに1回.投与中止後22日目まで.

### 4 CBDCA+PEM 01MP200E

1サイクル=21-28日間 予定:4-6サイクル.

催吐性リスク **中等度(上)**

順	薬品名	投与量	肝	腎	経路・時間	1	2	3	4-21
	アプレピタントカプセル	制吐			初日125mg、2・3日80mg	●	●	●	
	生食 100 ml	プライミング				●			
1	グラニセトロンバッグ 3 mg デキサート 4.95 mg	制吐			点滴30分	●			
2	⑤アリムタ 生食 100 ml	500 mg/m <sup>2</sup>	不要	CLor 45≤	点滴10分	●	×	×	×
3	カルボプラチン 5%ブドウ糖 250 ml	AUC* 6	軽中 不要	Calv ert	点滴60分	●	×	×	×
4	5%ブドウ糖 100 ml				点滴	●			

パンピタン末:1g/日:7日以上前から連日経口投与する.最終投与日から22日目まで.

メチコパール注:2A(1mg)/回:少なくとも7日前に筋肉内投与し、9週ごとに1回.投与中止後22日目まで.

薬品名の印 ① filter ② hydration ③ premedication ④ route flush ⑤ supportive therapy ⑥ Time control ⑦ washout ⑧ vesicant drug.  
 \* 肝腎機能の項は、指標があるものは「必要」or「不要」、明瞭でないものは「考慮」or「不明」で表記。  
 無断転載禁止

5 **CDDP+GEM\_01MP070E** 1サイクル=21-28日間 予定:4-6サイクル.

催吐性リスク **高度**

順	薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2	3	4	5-7	8	9-21		
	アプレピタントカプセル	初日125mg、2・3日80mg			内服	●	●	●						
	デカドロン錠 8 mg				内服		●							
	生食 100 ml	プライミング				●								
1	生食 250 ml	水分負荷			点滴30分	●								
2	パロノセトロン0.75mg50ml デキサート注 9.9 mg				点滴30分	●								
	生食 100 ml デキサート注 6.6 mg				点滴30分								●	
3	① <b>ゲムシタピン</b> 5%ブドウ糖液 100 ml	1000 mg/m <sup>2</sup>	必要	考慮	点滴30分	●	×	×	×	×	●	×		
4	ソリューゲンF 500 ml 硫酸Mg補正液 10 ml				点滴60分	●								
5	マンニトール 200 ml				利尿			点滴30分	●					
6	② <b>ランダ</b> 生食 500 ml	80 mg/m <sup>2</sup>	軽中 不要	必要	点滴120分	●	×	×	×	×	×	×		
7	ソリューゲンF 500 ml				点滴90分	●								
8	ソリューゲンF 500 ml				水分 負荷			点滴90分	●					
	ソリューゲンF 500 ml							点滴120分		●	●			
	ソリューゲンF 500 ml							点滴120分		●	●			
	生食 100 ml													●

6 **PEM単剤\_01MP300E** 1サイクル=21-28日間

催吐性リスク **軽度**

順	薬品名	投与量	肝	腎	経路・時間	1	2-21
1	生食 100 ml デキサート 6.6 mg				点滴30分	●	×
2	③ <b>アリムタ</b> 生食 100 ml				500 mg/m <sup>2</sup>	不要	CLcr 45≦
3	生食 100 ml					●	×
デカドロン錠 8 mg 皮疹予防に4 mg/回×2を前日から3日間内服することあり パンピタン末:1 g/日:7日以上前から連日経口投与する。最終投与日から22日目まで。 メチコパール注:2 A(1 mg)/回:少なくとも7日前に筋肉内投与し、9週ごとに1回。投与中止後22日目まで。							

7 **VNB単剤\_01MP350E** 1サイクル=21-28日間

催吐性リスク **最小度**

順	薬品名	投与量	肝	腎	経路・時間	1	8	9-21
1	生食 100 ml					●	●	
2	④⑤⑥ <b>ロゼウス</b> 生食 50 ml	25 mg/m <sup>2</sup>	必要	不要	点滴5分	●	●	×
3	ソルデム1 200 ml	ウオッシュアウト			点滴30分	●	●	