

## 《原発性肝癌の抗がん剤療法》

### 肝動脈化学塞栓療法 (TACE)

#### 1 ファルモルピシン肝動注療法 アンギオ室で使用.

#### 2 テセントリク+アバスチン併用療法 1サイクル=21日間

催吐性リスク		軽度					
薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2-21	
生食 100 ml				プライミング用	●		
1 ㊦㊦テセントリク 生食 250 ml	1200 mg/body	軽度 不要	軽中 不要	点滴 60分/30分	●	×	
2 ㊦㊦アバスチン 生食 100 ml	15 mg/kg	不要	不要	点滴 90/60/30分	●	×	
3 生食 100 ml				最後の流し	●		

#### 3 イミフィンジ+イジユド併用療法 1サイクル=28日間(2回目以降はイミフィンジのみ投与)

催吐性リスク		最小度					
薬品名	投与量	肝	腎	経路(分)	1	2-28	
生食 100 ml				プライミング用	●		
1 ㊦㊦イジユド 生食 100 ml	300 mg/body BW30kg以下: 4mg/kg	軽中 不要	軽中 不要	点滴 60分≦	初回 のみ	×	
2 ㊦㊦イミフィンジ 生食 100 ml	1500 mg/body BW30kg以下: 20mg/kg	軽中 不要	軽度 不要	点滴 60分≦	●	×	
3 生食 100 ml				最後の流し	●		